庫全書

子部

とこうるとことする 治痛渴丸 欽定四庫全書 右搗末以肥苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即 **回中搗爛納黃連末回中和搗便九得疾併手丸梧** 普濟方卷一百七十七 麥門冬肥者二大兩 黃連九節者 痟渇門 痟渇 四十便良方 普濟方 礼 明 周王朱橚 撰 於

金好四月至言 **野以來細細服之亦不用着鹽不過三劑平復海上** 枚净去毛洗了以水三大肆煮令爛去頭取汁可 見知少可每日服二十五九服訖覺虛即取白羊頭 先看天氣晴明其夜方浸藥切須净處禁婦人 若重者每服1百五十九第二日1百二十九第三日 桐子大食後飲下五十九日再但服兩日其渴必定 万治痟渇九云偶于野人處得神效不可言 百九第四日八十九第五日依本服之若欲合藥 巻一百七十七 八雞犬

欠己の事を動 為九如上服 同其方用黄丹麥門冬牡蠣知母各一兩黃連天花 為衣每服二十九日二服同瓜養根汁下次用麥門 粉苦参各二兩金箔百片銀箔二百片生栝樓根 右為末以審入天花粉汁同九梧桐子大用金銀箔 冬湯下病退忌炙煿酒色次服補養藥與傳信方稍 一法存方 白扁豆少煮爛去 普濟方

治病渴熱息方 香墨散 無 然怕飲服三五日見效 錢不計時候服藥時不必忌水任意飲三兩蓋後自 右為末二錢新水一盞調下次日一服水調樂末 右細研以温水一大盏調令匀分三服食前服之 櫻栗合 香墨一括樓根二鉛丹半 出聖濟 或心神煩亂宜服此 治痟渇 ð **と十七** 火に口むという ス方 瓜連九出經驗 養之待螺食盡粥却吐沫收 及二卧巳来候冷即将田螺置於冷粥盆内以物盖 瓜煎湯隨意服之 餘日覺冬瓜內消盡為度同研九梧桐子大毎服久 右用大冬瓜一枚去瓤入黄連細末實冬瓜內浸十 田中活螺三升洗去土叉以糯米二升煮為稀粥可 出聖 忠す 治消渴骨蒸 普濟九

括模粉出す 治病渴及小便多金方 夜易水經五日取出爛搖碎研之以絹袋濾出粉節 薄切炙乾五兩水五升煮取四升隨意飲之良 每服三四十九温熟水或新水或白湯放温服一方 之水服方寸七日三四服亦可作粉粥乳酪中食之 深掘大栝樓根厚削皮至白處止寸切水浸一日 右用瓜萋粉和雞子打和得所曝乾為末滴水為九 治大渴

又方草 叉方 欠己日長 とこう 治不渴而小便大利垂至於死者 驗 水和栝樓散服方寸七亦可蜜九梧桐子大服三十 右用牡蠣五兩以患人尿三升煎取二升分再服神 凡方見渇利類 不限多少取瘥止孫思邈作粉治法 出十 出本 金方 普游方

治消渴 治瘠渴頭痛壯熱又婦人血氣牢閉不堪者及五淋 金月四月月十 破血 右搗取汁令盡渇飲之一方白茅煎汁服之白茅能 以青梁米煮取汁飲之即瘥 右㕮咀水一碗去滓頓服之立效 茅根二升 東黃連一两八 Ł x

大記の事会語の一番海方	可	右水漬汁飲之最良小便數亦可服或煮汁服之亦	田螺	治口渴失精醒酒	右飲數升即愈一作煮泔	栗米泔	治霍亂心頭卒熟渴出本
Ā		服或煮汁服之亦					

治 専治日夜發得飲水頻併魚治黃腫出財 末用活腳魚煎湯調一錢小兒調半錢只二服瘥 右於腦日或端午日用黄涩裹煅通紅放冷取出為 右以醋煮食之 切得後方 大壮蠣 牛肚 浮萍草 基 б ł ナモ 火之四軍を与 治渴備急方無録 專治渴 煎人參湯調下 右以三五十整堂酥炙令黄熟捣羅為散每服 右㕮咀每服半兩水三蓋烏梅 右八月取来陰乾為末臨卧酒調或淫 大豆苗椒 扒競強 一名 出聖濟 箇煎 養

治渴出危 治病渴方此聖 ほじてり 細呷或生蘿蔔塩取汁時飲少許 右取中一尺焼淋汁飲或不燒便煎服亦妙同生牛乳 取汁服之盡更佳 右埋在濕地中一月將出破開取清汁飲之或燒絞 冬瓜七皮削 糯稻稈灰 濟 F Ł

又方良方出十便 止渴方 治熱去煩渇 ‡ 火に日華を動 右取去皮食後喫之煮皮作羹亦住 右味酸寒無毒主之 桑葉义 酪 甜瓜 晋满方

又方出力 治湯方出財 |酒後煩熱渇 右渴者腹當飽研取白汁飲之以瘥為度 右海取泔飲訖則定 右煎飲之一如茶法 糯米 糯米二 б Ł

钦定四庫全書 日 普流方	右合并者食之良	羊肺 小豆葉	治渴止小便數出本	右用作飯水泊食之	小麥	治煩熱少睡多渇	右於姜醋中生食之亦主丹毒	牡蠣肉
4								

治病渴傷中小便數出本 治疗渴不止下元虚損出 筋骨駐顏色黑髮津液自生一方粥飲下 右治如常者令熟去難停冷渇即飲肉亦可食若和 為度蜜九如梧桐子大空心酒下三十九後久服壮 右將牛膝細判為末入生地黄汁內畫曝夜浸汁盡 黄雌雞 隻 牛膝五生地黄汁五 後方

敗定四車全書 桑根白皮湯出肚 過三服便效 出骨肉斟酌五升汁便澄濾令冷渇即飲之極重不 米及鹽豉作粥及五味作羹並得 右剥去皮爪五臟等水一斗半煎使爛骨內相離源 桑根白皮入地三尺取桑根利 兔 草 出本 隻 白皮炙令黄 治卒小便多消渴 普濟方 剉

又方出本 治病渴出本 右和煮飲之自死牛鼻不如落厓死者良 治瘠渴後成癰疽粗捣篩每服二錢水煎 右用煮汁服之 右水煮之令濃随意飲之亦可納少米勿入鹽一 麻鞋底故 石燕 水牛鼻 卷一百七十七 決定四事会写 治病渴当本 獨勝散出財 治消渴飲水不知此本 右净洗薄切晒乾為末每服二錢煎猪肉澄清調 食後并夜卧日三服 右切作嚼以土蘇煎令病人嚥津白鶴即鵯鶴也 花白鸽 離當出子者 三枚 普濟方

治病渴風熱益氣力發氣脹出本 治病渴引飲無度食韭苗自止法出財 右日學三五兩或炒或作羹不入鹽效但學十斤即 右以食之 右蒸煮炒任食之 荔枝 韭苗 苦竹笋 1.7. 卷 百 セナセ

治痛渴止煩悶 煩熱消渇 佳過清明勿喚醬肉無妨 右為散服之 粒煎至半盞去浑每於食後及臨卧煎服之當解煩 右為末每服二錢水二盞煎一盞去滓熟入豉二百 烏梅肉二两 真珠 知母

欠足日東をい

普濟方

治多年消渴無不瘥者 治病渴出本 金りせんべき 治大渴日飲數卧小便赤者 止渴也 右作靡食一卧效 右用煮頭汁令服三二升 壮騙骨 糯米 卷 草 . 出本 一百 Ł Ł

次に四軍を与 治病渴補肝腎氣和小腸療虚勞益精氣出本 治病渴心脾中熱下焦虚冷小便多漸羸瘦者出本 右用水二升煮三四沸取汁飲之無限服過九升 右渴飲三四合一方用牛羊乳 子愈麻牙令人精 羊乳 麻子 黄牛乳 羊脂 普濟方

治疗渴 自じして ノノー 治卒消渴小便多見方 合 毎食後嚼喫三二兩五七度良 右恣飲數日愈一方治痛渴小便不利食後時飲 右合作羹食之亦主女人與男人中風 濮瓜皮去 竹瀝 出十便 卷一百七十七

火也写真人 治煩熱消渴出本 治病渴日夜飲水數斗小便數瘦的者 亦佳 右侯熟收之取瓤和蜜煎作膏食之一名藤黎一名 少豉渇即飲之內亦可喚又和米着五味煮粥飲之 右用水洗净水五升煮冷爛熟取二升已来去肚着 猪肚女 獼猴桃 草 普瀬方

止煩渴出本 治煩熱病渴出本 右以煮飲服之 本子一名獼猴梨大冷不可久服 右以服之 色焦油 麥門冬出 出本 卷一百七十七 **收之四車全書** 叉方 治清渴得效出月 方用酒煮三沸去滓飲 右水一斗煮三五沸渴即飲之恣意飲數日便止 右取烏豆置牛膽中陰乾百日吞之即瘥 黄蘗介 比梨 烏豆 牛膽 普濟方 +

猪肚丸处方 漸加至四十九渇則服之如無木白以沙盆中用木杵 右為細末納猪肚內線縫安置甑中蒸極爛熟就熟 研亦可爛之為妙 木臼中搖可九如硬少加蜜梧桐子大每服三十九 右每日服食以安為度 猪肚人黄連五括樓四麥門冬去心知母四兩如 治消渇 卷 一 百 Ł 沙主四車全馬 一 酒蒸黃連九一名獨連九 九一方用蜜丸無酒蒸 飯前服之温水下初伏日為頭服之一方以醋煮和 右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九大茶 消渴人喜水脾胃惡濕黃連為對症 **鸦潭今用黄連味苦寒無毒除熟氣止煩渴厚腸胃** 三斗小便五七十次發熱瘦弱口乾食已如饑此名 黃連落候時取出眼乾 普濟方 治病渴日飲水數升至二

治病渴出聖 效散出家藏 取頻汁服 右為末水調日三服有人患此九年服七日愈經驗 方陳氏云昔鄂渚李祐之嘗病渇九年服樂不一往 右飲任性多少瘥止一方豆豉三合以水二大盞煎 豉汁 白芍藥 甘草各等分 恵方 治病渴 百七十七

又方後方 次ピリ事を言 治痟渇 净洗槌破水煮濃汁食後温頻服一小盏 右用煮之多飲即惡聞水氣一方故屋上古瓦兩張 者不當以所用之樂平易而忽之也 傾愈今年餘不作覺前後所服之樂取效無愈於此 往止而復作與蘇朴宰交因授此方服三四日疾勢 故破屋瓦 普濟方

又方 付りてノハニ 常而頻溺連年服藥不愈者可用麝香當門子一箇 效止嚼梨亦妙東坡家藏方載消渴日飲水數斗食倍 右用蜜熬瓶盛不時用熱水或冷氷水調服大有功 右用濾過勿使患人知飲一碗即愈 須浸之作十小九以枸杞熬湯送下随意此病脾脈 看水梨或好為梨或江 撏猪湯 治病渴 南 雪梨俱可 百 セナ

次已四事在馬 人参白术湯 病或恣酒色誤服熱藥致脾胃真陰血液損虚肝心 渴也言甚當理服者審之 停積生冷雖實飲過人而喫水既多不得不溺非消 則周身不得潤澤故瘦瘁黃黑而燥熱稍渴雖多飲 中善食而瘦或燥鬱甚而稍渴多飲而小便數或熟 實而腎脈衰初因飲酒瓜菓過度熟在脾內若胃而 相搏風熱燥甚三焦傷胃燥怫鬱而水液不能宣行 治胃膈痺熱煩滿不欲食或癉或為病 善濟方

生りせり とう 為消腎此世之所傳三消病也雖經所不載以內經 為府渴多食數溲為病中肌肉消瘦小便有脂液者 考之但燥熱之為甚者也此藥兼療一切陽實陰虚 温熱内甚不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數溲 鬱或目瘴癰疽瘡瘍上為喘嗽下為痿瘫或停積而 風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切勝胃 **澁滞壅塞瘡疥痿痺并傷寒病雜煩渴氣液不能宣** 而水液終涸下焦虚冷誤死多矣又如周身風熱燥 卷 一百七

次定の車を書 膱腑疏利亦不妨取效更妙後却常服之或兼服消 絞汁入蜜少許温服漸加十餘錢無時日三服或得 通並宜服之 右為粗末毎服五錢水一盞生薑三片同煎至半盞 青四滑石半盆硝半 澤鴻巴上各連翹 人參 官桂 白术 木香 普濟方 當歸 霍香 寒水石為一甘草两石 枯樓根 乾葛 茯苓色 ち 樂 大黄 山梔子

無比散 痞九似覺腸胃結滞或濕熱內甚自利去大黃首硝 宣明論有荆芥穗薄荷桔梗知母四味不用盆硝 右搖節為散一服每方寸七日再服夜一服以後藥 下之 草 腸三桑螵蛸三七難肚脛黄皮三十 土瓜根六苦參粉 美黃者各三黃連去毛牡蠣煩白龍 研各雄雞 治病渴 鹿茸 沒枯樓 白石脂研甘

黄連九 次と四事をよう **服可取此藥汁和九一服六十九仍還用此藥汁** 之思猪肉海藻菘菜 右水一斗二升煮取三升五合以下前件散藥如難 龍膽 地骨皮枯樓根分十 麥門冬 茯苓 黄連 石膏 姜雞分人 竹根十多門冬七石青 各四两甘李根白皮三 治病渴除腸胃熱實 黄本分升麻分积實五生薑 普濟方

土瓜九門冬九 消瘦 右水六升煮取米熟用煎藥 右為末蜜九如梧桐子大以茅根栗米汁下十九日 一服若渴則與無比飲至足大麻麥亦得飲方如左 黄連 **苑根→升東米三** 土瓜根谷六人冬 麥門冬十分苦寒 治脾胃中熱痛渴小便數骨肉日漸 一百七十七 甘草分炙 枯樓 知母 茯神

次七四事全書 黄連九 十九不頓為九經宿即不相著也 梧桐子大一服二十五九飲下日再服漸漸加至三 麥飲下二十九日二服漸加至三十九取利忌海藻 右為末生地黄汁牛乳各三合栝樓根和頓為九如 菘菜狗肉等物一方無黄連 右搗篩和蜜九如梧桐子大每食後少許煮薰根大 黄連 治消渴 毛一升麥門冬五錢 善濟方

治稍渴熱或心神煩亂宜服此 稍渴及小便多並是虚熟但用冷補將息即瘥前件三方 蓋去浑食後分温二分半天河水在槐树間者 石以半天河水一中蓋井華水一大蓋同煎至一大 並是冷補空腹服下常喫少許食壓之大好忌猪內無 1V 夷崔氏本方中此處更有一方用 栝樓根黃連去 地骨皮! 兩 卷一百七十七

又方息方 又方忠方出聖 又方出聖 欠己の事を写 兩和九如梧桐子大每服不計時候以粥飲下十九 右以酒一中盏洗取瓤去皮子煎成膏入白礬末 右搗碎以水一中盞煎至六分去滓温服 括樓一顆 出聖 冬瓜瓤里南 恵方 普濟方

又方忠方出聖 又方出专 腹食一大盞 右每服以新汲水調下一錢兼每日作蕎麥仁粥 右為末用水銀同結如泥取大豆許大常含嚥津 黄丹不限 黑鉛剉 蠶蛹 兩 一百七十七 **挨神九浦九** 樓連九一名黄 蛹服醬蛹未成蛾者 右頻服神驗 右以無灰酒一中盏水一大盞同煮一 烏麻金三 出聖 恵方)出朱氏 集驗方 治病渴 治稍渴止小便數兼消中 治消湯方見本門消湯 .普濟方 中蓋澄清 '方見本 掮野類 Pg

治中焦渴上 加味四君子湯 右等分為細末白湯調下 石煉蜜為九毎服五十九空心北五味子 甘草 鹿茸兩兔絲子 蜜炙石膏 二山栀? 白茯苓 一两 出朱氏 集驗方 華華 我 酒蒸 白术 燕 天花粉平 б 治瘠渴 セナセ 廿草 六两 桔梗 悧

第三下 第二中 災亡四事と言 ! 温服 右㕮咀入燈心七根麥門冬七粒同煎至七分去滓 右為未毎服二錢蜜水調下 熟地黄 川牛膝酒枸杞子 白茯苓 雞内金 普濟方 黄耆兩二甘草 黄耆蜜白茯苓 茯神去 麥門冬去心各 1

第四下 米飲下 右為細末煉蜜為九如梧桐子大毎服三十九空心 右㕮咀每服二錢入燈心七莖煎七分空心温服 茯苓 人參 免絲子再浸鹿茸酒從蓉魚黃者 五味子 机把紫去毛炒 熟地黄 天門冬出积殼私麥門冬去石斛去根 船尚香各一 白

次定四車全書 帯海方 第二中 治下焦渇上 右㕮咀每服二錢燈心煎七分食上服 前子 雞內金 桑螵蛸炙雷歸 心磁石酒碎 茯苓 治下焦用此方 茯苓 山栀子 遠志 人參 黄耆 甘草炙各水通半 熟地黄 川芎 大黄 製理麥 滑石 黄耆家澤鴻去桂心去 龍骨各一麥門冬五 五味子 夏

第三下 右為末空心酒任下 右為細未麵糊九梧桐子大每服二十九空心鹽湯 F 计各半 白茯苓一赤藤一兩又芋麻根半車前子 錢五 兩 出華陀中 截經方 治下焦渴及淋巴上七方係鄭 治痟渇 巷 百七十七 次定四車全書 一 治渴三神湯上你渴濁方 二神散 又有熱者加黃連去茯苓白木 右為細末每服二錢用糯藁頭煎張方不同有遠志 右件為末每服二錢濃煎麥門冬苗湯調下服立止 荆芥穂 烏梅肉 寒水石生甘草半炙葛粉分等 治病渴 白茯苓 枳殼 桔梗各一廿草 普濟方 白木谷一 莱克

沈香散 治三痟上威下虚諸藥不效 右㕮咀薑煎一方桔梗~甘草~水煎食後服名甘 养根煎夏月加黄連遠志 枯湯咽痛如三朮用鳥梅肉遠志肉製枳殼等分加 右以薑湯調服一方有白木 两 肉 白扁豆薑汁沒茯苓 山樂 砂仁 桔梗 百七十七 意以仁少各乾葛 人外 甘哲 沈香名

飲定四車全書 六合湯 鉛參散 前 右咬咀薑棗煎加乾葛又宜縮脾飲冷服 右為細末每服一大錢濃煎麥門冬湯調下空心食 黄丹坂研别非粉炒研别人冬三分天花三 砂仁 半夏 杏仁泉人參 藿香 扁豆炒木瓜為二香薷 厚朴製名 治酒後頻渴或傷生冷或吐或泄 普游方 甘草两二 ž

從蓉九 治渇 四粒濃煎陳橘皮湯空心服只三兩服須微寫煎兔 右和匀杵軟飯為九梧桐子大以真蒲黃為衣每服三 脂 削着木二两只用 從客酒磁石雌熟乾地黃洗山菜 更去黃者去藍 無只用透明生硫磺亦得研令極細一兩此是老硫磺色帯紅者是也如人力取賣薄片子者方可用碾羅為 濃煎湯如熟水今冷任兔絲子湯洗净用砂石 百七十 ż 意服器 羅為細末石亭

火七日東人語 斷涓湯 治痛渴不止 右為粗未每服三錢水一盞半煎至六分去滓温服 右為末煉塞九梧桐子大每服五十九空腹米飲下 浸澤鴻 骨 柯 烏梅肉~麥門冬 人參 甘草 茯苓 乾薑 各 五味子極華撥 破故紙 巴戟酒兔絲子酒龍 杜仲去皮到薑汁拌附子吃去皮臍 鹿茸去毛遠志去心薑石斛 普濟方 Ŧ 覆盆子

治渴不問遠年近日 金グセノノニ 解渴百盃九 右為未煉審九三四十九空心鹽湯下 遠志去山樂 香 黄耆 茯神 白茯苓 人參 木瓜十枚爛蒸 局梅去核甘的 麥門冬 兔絲子酒浸各 紫蘇葉三味各百樂煎研 木香 牡丹皮 卷 百七十七 五味子各 鹿茸 龍骨

第一方與 | 快走四車全書 | 服一丸含化 右件為細末同研与將木瓜搜和為九如雞頭大每 用第二加瞿麥兩 右每為十貼渇即止再依此方合一貼服後再不可 北柴胡二木通一甘草五黄芩五枳殼一两弟 炒 二兩第二 加半雨 ·普·濟方 錢

第二方 第三方 右㕮咀薑一片棗一枚煎服不拘時熱退即止 蒼术 半夏五錢沸湯白茯苓 骨皮的黄芩鄉木通纸 半赤茯苓或猪苓或澤寫我白木或北柴胡氏地 厚朴 | 宿判碎炒| | 雨米泔浸 藿香各一甘草 厚朴 当炒陳皮三銭五廿豆 一百七十七 二錢草東五豆蔻錢 陳皮各五萬木

| 決定四軍全書 | 第四方 右並修治如法煉蜜九如梧桐子大每服四十九至 右㕮咀每服加烏梅一個煎食後服 弊三分為衣一兩七分入 前子 揀參 两酸栗仁微炒北五味子 一遠志二两甘草水車 焙天冬慢火焙乾肉桂人減半兩麥門冬依天門洗天久一兩去心肉桂一兩陽臟多門冬依天門 研關熟地黄一兔絲子宿蒸三次一兩熟地黄一兔絲子二兩酒浸 白茯苓 茯神各 普濟方 五花龍齒一山藥 二兩酒浸三大碌砂 克 兩

治水火交戰面赤油色身熟心煩而渴者 第五方 右為末酒糊九如梧桐子大每服五十九鹽湯送 又云莫若鹽水煎糊為九較妙 六十九空心燈心菖蒲湯下又麥門冬湯下 附子雖白茯苓 後三白龍骨各二 宿 两者去附子用天花粉等皮者 徒神半雨去)半两用附子半天花粉半雨花 两者去附子用 卷一百七十七 牡蠣服各陳艾葉 益智仁縣

沈香散 大をり事を馬 右吹咀用禾根麥門冬煎服 右攻咀每服三錢水一蓋半煎至七分去浑大口服 空心一日三二次生津液醒酒止渴再用醋林子以鹽 醋收藏以克菓子食之不可多食令人口者粗折及 心煮 霍香西 給粉五錢 人參 沈香 木香 調心氣止渴生津之藥 普濟方 白木 乾葛 白茯苓

治痟渇 主下氣止渇令人不晤 右取炙令黄香作飲食之 和魚鱠食之勝用酯也 熟採之陰乾和核同用其葉味酸夷獠人採得入鹽 右取煮汁飲之 白鵞 葱母枝葉 卷一百七十七 次と四事を与 止渴 止渴除煩潤五臟利大小便去渴止熱 止渴明目除煩不睡痟渇 右取水煮飲之以當若今人通夜安睡 右用噉之煎如飴食亦得 見炎 **松蘆木葉** 木蜜枝葉 普濟方

班龍腦珠丹 止渇 右以食之 右擘破水漬以少蜜相和服之 右以作粉食之 烏梅肉 石榴子 鹿角霜井兩鹿角 蒸棚為九用藥 免絲子浸蒸十两酒浸數日 免終子 十兩 б とナン

水葫蘆九 酣醉於酒樓上歌日尾間不禁滄海竭九轉靈丹空 右將東藥研調却以鹿角膠酒三四升煮糊搜藥杆 鏝說惟有班龍腦上珠能補王堂闌下穴一作有人遇 十九至一百九成都府每開藥市有緑髮美顏道士 三千下九如梧桐子大早晚空心食前鹽湯任下五 之乃得此方 乾 拍子仁别研 熟地黄乳以餘酒入膠用餅焙拍子仁十两净熟地黄十两酒浸二宿蒸焙 生津液止煩渇利咽嗌 ·普濟方 Ī

吹之四車全書

梅蘇丸 止渴生津液 含化嚥津不拘時候或新汲水化服亦得 右五味為末入麝香勻入乾糖净八兩蜜一兩同煉 石為細末煉蜜和丸每兩作三十九每用一九綿裹 肉炙各 紫蘇葉 烏梅肉 錢麝香一錢 乾木瓜 乾葛卷三木瓜 紫蘇葉各一甘草魚 甘草 ~ 災半白檀

次之四軍全書 白木散 右為細末毎服三錢水一大蓋煎至七分去滓温服 候或新水化服亦得 不拘時候 和為劑每兩作二十九每服一九細嚼嚥津不拘時 生津液 白术 各 凾 乾薑 治諸病煩渇津液內耗不問陰陽服之渇止 兩 頭 頭 茯苓皮甘草 養香葉 普濟方 Ŧ 木香


福壽二味散 稀稠得所不可犯婦人手 右如法炮製同為細末每服一二錢沸湯點服 右為細末毎服|錢用男兒津晤於左手心內調令 梅肉 生量而 白鹽少雨 乾薑用石決明分等 止渴生津和氣暖胃與口悅神 甘草多四草豆蔻仁 蹇 百七十七 桂心 木香 乾

火七四車全書 治止消渴第一方 稍渴出力 冬瓜飲子 料立愈 右調成飲子時時喫一盞喫藥時不可與水不過二 右煎湯常服渇則飲之 大冬瓜去皮搖爛取自五苓散二兩 黄連 括樓根分生冬瓜十 普濟方

第二方 右将三味入瓜中浸七日後焙乾為末煉蜜九每服 右咬咀每服二錢水一盞半薑薄荷煎温服 大黄短果 當歸 芍藥 大冬瓜一節黃連一两半麥門冬去心天花粉各 芥穗 各六白术 末 兩為 天花粉 宣連兩各 兩羅參 一百七十七 茯苓去皮各五味子

第四方 次定四車全 第三方 每九麥門冬湯嚼下 右為細末煉蜜九如彈子大用金銀箔二十片為衣 二十粒空心熱湯下 鐵雄粉川研知母錢苦參 天花粉為蘆薈各半 宣連二兩去鬚童白扁豆少 辰砂雨牡蠣一 枯樓根 茯苓去五味子 黄耆各 普濟方 兩

聚瑶丹 治渇三神湯 右為末煎人參湯更合八味九山藥九服 右為細末煉蜜丸如梧桐子大毎服三十九鹽湯 茅根巴上各 青黛 羚羊角作葛粉 犀角屑栝棲根 白霜 天花粉 人參 龍腦 黄連石半 卷 五味子 百七十七 括樓根多 白茯苓 白




龍膽九巴上十方並係鄭 金りでんとう 珍珠龍腦九 湯送下空心臨午及卧時服 右為末煉蜜九如雞頭大每服一九嚼細用麥門冬 右為末每服二錢煎枇杷葉湯調下空心服 粉两黄連年两 氏家傅渴濁方 神砂 治病渴鎮心安神 去頻 取汁浸炙盡為度二兩用維猪膽一枚 珍珠為半銀箔五十腦子錢天花 百七十七


火とり事をよう 治肺渴出本 止渴潤肺出本 右以含之照津以解之天寶遺事云唐贵妃當用此 右用生食之 嚼細空心冷白水下噙下亦可 右為末入腦子半錢煉蜜九如梧桐子大每服二九 在子 玉 普濟方 幸


治病渴出本 金ガロルハラ 免絲子九傳湯濁方 方 右以飲之 右為細末蜜丸如梧桐子大空心飯湯飲下三十粒 宿船苗炒鹿茸酥臭各 好井水及土石間新出泉水 免絲子浸一宿 五味子 百七十七 白茯苓 肉從蓉酒

一 飲定四庫全書 一 王真丹 補骨胎九出鄭氏家 湯任下三十粒 右為細末滴水空心下 右將丁公藤細末同所浸酒打糊丸如梧桐子大鹽 贵柘且皮 滑石净末知母 補骨脂 香附子春一 傅涓 濁方 舶尚香炒丁公藤酒浸各鹿茸 普濟方 兩 Ź 五銭次 酥災




次之四事全馬 治消渴 治痟渇 止渴潤肺通氣脈填骨髓 右以帮飲之 右以蒸熟曝之今口開春取仁食之 右以漬汁食之 椰子 芭蕉子 普濟方





止渴 理正氣止煩渇和中補脾利大腸解酒毒 治猜渴 右食之酸鹹能止渴一方用鹽麩子乾搖為末食之 右煮食之勿用鹽 右以煮食之 胡豆子 鹽麸子葉如椿秋熟為德 を一百七十七 粒 雪



金にりローノスコー 治煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛 治痟渇 治渇鎮心 右以食之父服輕身亦得悅人顏色 右用作飲代茶 君遷子 薏苡仁 晁蘆葉 百七十七

止渴 治病渴 治消渴下氣令人能食利五臟調中 右取以生薑醬食之消腸中宿物今易饑止小便 右煮汁飲之 右煮汁飲之 李根 海月 曹酒方

治痟渴 治消渇重者 右取一小蓋服之勿令病人知之三度即瘥 右浸取汁服之 右煮汁飲之 蚬肉 粳米 市門衆人溺坑中水 モナナセ 次之四軍全書 人 治病渴 治病渴 治痟渇 右絞取汁服之 右研煮飲服之 温麻 菉豆 稻草 普濟方

止渴潤五臓去温痺熱及山行無水處用之 愈百疾止消渴令人身輕不饒肌肉悅澤 治渇潤肺去煩除痰 右斷之得藤中水清美可飲 右用水煮作飲服 右以汁飲之 含水藤 都咸子及皮葉 1 百七十七 次と四事を 痟渇 一渴療執 右等分為末糊九如梧桐子大毎服一百九黑豆湯 右取飲之 馬乳 硃砂 秋露水在百草 天花粉 普濟方

治三消 治三病 金グビノノニ 止渇理肺 右煮服之 右煮飲之 右以飲之 風延母 机把禁去 卷一百七十七

治 叉方 火己の野人時 右用作虀俎食之 右取生鮧魚涎黄連末作九飲後鳥梅煎飲下五七 凡渴便頗减 切消渴 好宣連五黃 松菜 生鮧魚涎 黄連春 普濟方

金げんでたろうかと 右不拘兩數研冬瓜自然汁浸黄連一 再浸曝几十次乾為細末再用冬瓜汁為九如梧桐五 **又每服二三十九熟水吞下** 浴方卷一百七十七 一百七十七

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十八

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

校對官典簿臣劉景岳 總校官庶古士臣何思釣 滕 銀監生臣何延禮

次之四車全書 用 普府方 周 稍水故小便少 映熟結於肾内石性 名内消此由脾 撰

盛則作瘠中故渴少食多而小便赤黄也宜滋腎水養 肉莊蓉九 液則差也 肉從落切焙 心地骨皮 出聖濟 總錄 各 两澤鴻 卷一百 + 枝赤石脂 栝樓根 セナ 熟地 極小便無度 研龍門 磁石

壮蝇散 次とり事を言し 右為散入研了樂令勻每服不計時候煎大麥 脚膝無力毀食不成肌膚 右為末煉蜜九如梧桐子大每服三十九牛乳 鐵粉細研澤鴻平甘草做赤對黃丹分枯樓根 雞肌厘兰兩令桑螵蛸 牡蠣三分焼砂半雨龍齒三蘆首二黄 治病中心神煩熱肌肉乾瘦小便 普满方 胡粉分赤石脂一 二兩

天門冬九 金にひしる 調下 背膊疼悶小便稠濁 右為末煉塞和九如梧桐子每服二十九煎栗米下 半苦參兩 **鴻 当鹿茸** 者內從容宿切好乾熟地 天門冬去心好難內金 也具桑螵蛸十枚土瓜根 1:1 總錄 出聖濟 酒浸炙五味子 治初得府中食巳如飢手足煩熱 卷 百百 **七** ተ 枯樓根 牡蠣椒二赤石脂內 知母培澤

大乙の野人は 牡蠣九出聖海 右為末別研二味和匀煉塞丸如梧桐子大毎服三 疼小便稠濁 九煎陳栗米飲下日三夜! 焙酒 乾浸 牡蠣 亦石脂 枯樓根各一黄連三两內從容 两熟乾地黄两牛 天門冬培心鹿茸去皮毛五味子 兩 雨 土瓜根 黄芩去黑知母 澤鴻 治痛中食已即餓手足煩熱背膊悶 普濟方 桑螵蛸处炒

附子猪肚丸出言 金分口月八十 升童于小便五升同入砂鉢内熬乾硏爛細入一 右為末分作三分將二分入猪肚內縫定以蒸酒二 便反堅小便無度 喜啖鹹食及麵致脾胃乾燥飲食倍常不生肌膚大 破故紙各半两枳殼子半两 本香吃川楝炒秦光土 大黄 潛龍胆草 附子皮脐核棉一两 驚甲 治病中多因外傷痺熱內積憂思 卷一百七十八 貅 雨半當歸 知母 白芍

火足の事全書 猪野葬花湯金方 右㕮咀以水一 末同搜捣為九如梧桐子大每服五十九温酒米湯 下藥者取三升分三服渴即飲之下焦熱者夜輕合 神族石 猪腎具大豆什蘇港 石膏兩二人參 兩 知母 一到五升先者猪肾大豆取一斗去滓 治府中日夜尿七八升者 葛根 黄芩 普濟方 甘草 29

鉛霜散 金グセノ 亂眠卧不安 飲調下一錢 右為散入前三味同研令匀每服不計時候以清粥 **剩病漸歇即止** 根科知母科苦參對兩 鉛霜紅研金箔 丁苓料犀角料人參廣頭 雞肚胫一两半上瓜 恵出方聖 出 治痛中久不差令人乾瘦少力心神煩 銀箔 鬈 — 百 セナハ 麥門冬去心焙黃連半

次已四事全島 | 本艺九出海 黄蓍九出聖 計時候以清粥飲下三十九 右為末煉蜜和搖三二百杵九如梧桐子大毎服不 食不生肌膚 黄蓍切 壮鶇為粉 枯樓根平甘草半雨泉 黄連半著指用熟乾地黄料 門冬心培地骨沒料白石脂再澤鴻半知母井 治强中為病莖長與盛不交精液自出 治病中渴不止小便赤黄脚膝少力縱 普濟方

右為末用猪腎一具者如食法爛杯和為九如梧桐 **稍渴之後多作癰疽多由過服丹石所致** 酒糊亦可煉蜜九亦可 子大每服七十九空心用鹽湯送下如不可九少入 人参各半 木石八板細元参 枯樓去 葬尾 大豆去花神去磁石版細元祭 出聖 济 治内病所食物皆作小便魚治强中 — 百 ン ナ 欠にり与とは 從神九指方 三夜一 右件㕮咀每服五錢水二蓋煎至一蓋去滓温服日 母 二焙 兩各 敖私牡蠣粉的 道内·黄蓍 郑母去毛各括 葛根当石膏碎黄芩金品 桔樓根 甘草銀知 莾苨 大豆 人參盖後神去生乾地黃去黃連净麥門冬去枳 治鸦中煩熱消穀小便數 普海方 白茯苓去黑粗磁石棉

花從茶九 金グロカスツ 右㕮咀分為五貼每貼用水一升八合煎取七合去 右為末煉蜜和搖三百杵九如梧桐子大每服五十 九清粥飲下之 樓根七銭 並業各四覆盆子 桑根白皮 拔其各十黄着分 治渴多者不問食宜服煮散 薏苡仁 卷 枸杞子分、乾地黄分茯苓 五味子格六通草 百 とナハ 紫絲

大日日野日かり 石子蘇港湯出す 中最為難治 右到為散每用水三蓋腰子一箇去脂膜黑豆一 陰氣常與不交精自出中焦虚熱注於下焦三痏之 滓温服忌鮓物蕪荑 食或服丹真氣既脱藥氣陰發致煩飲水飲食倍常 葬花 石膏西三人参 知母 乾葛 治强中多因耽嗜色然及快意飲 普濟方 黄芩 甘草格二 茯神 枯樓根 ł 磁 石

水銀九總銀 黄著湯出千 分りしたノニ 煮至蓋半去腰子大豆入藥四錢煎至七分去滓食 右吹咀以水一野煮取三升分三服日三 後服下焦熱則夜間服渇止勿服次投補藥 加羸痩 黄蓍 芍藥 生姜 大豪松十黄芩 治府中虚勞少氣小便數 治痟中食飲無度小便日夜頻 乾地黄 麥門冬雨 桂心 當歸 甘草各二

飲定四庫全書 白木散出五 桐子大每服四十九煎蘆根湯下日二夜 右七味為末別硏三味和勻用棗肉硏搖為九如 白乾葛二木香两加北五味根 柴胡毛枳殼去 柯 水銀一銀箔二百片與鐵粉別土嗎 麥門冬培心黄芩培心苦冬 白术 白茯苓 甘草及藿香葉去土各 治消穀消中善饑 黄連 栀子

知母九息是 陽强內下威不交而泄其斃不久無治法姑録 方聊為備用云耳 凉藥則愈見虚贏不能起止精神慌惚口舌焦乾或 中皆旋結如胎肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈甚用 證飲食之腹如湯澆雪隨小便而出落於溷僻溝渠 右判散每服三錢新火煎去滓不拘時 知母 培麥門冬去心焙犀角 銷鉛霜 總録 治痛渴痛中久不差 ٦ 1 雞肚胵炙 脾消中之

次定四車全書 | 蘇尼散 きを 六分去浑不計時候温服 飲下 右為末煉蜜為九如梧桐子大毎服十九煎人參湯 右為散每服四錢以水一盞半入大豆一百粒煎至 根 葬尾一人參廣頭 葛根两石膏二黄芩 土瓜根各半白茯苓去黑黄連去须各金箔二十 知母 甘草各一兩微 治鸦中煩熱喫食旋消四肢瘦弱 普濟方

鉛霜九 黄蓍散忠力 右為散毎服四錢以水一中蓋入生姜半分竹葉二 七片煎至六分去滓不計時候温服 熱少眠宜服 炙微 禁一生乾地黄出桑根白皮出澤鴻各半甘草 黄蓍1雨麥門冬去心蘆根! 剉 恵出方聖 治病中渴飲水不多心神煩亂四肢燥 治痛中煩悶熱渴不止 蹇 一 百 モナハ 两枯樓根 紫燕蓝

次之四事 全時司 一 着游方 茯神九 此方 右為末煉塞和九如梧桐子大不計時候清粥飲下 子大毎服食後以清粥飲下二十九 右為末入硏了藥令匀煉審和搖二三百杵九梧桐 從神而地骨皮 黃著出母兩 牡蠣為粉 枯樓根分黃連三分麥門冬三分去熟乾地黄 母分子本分錢粉細研黃連再殊砂料两母三子本二錢粉拌兩黃連半 鉛霜三分枯樓根一 治病中煩熱小便數 平 甘草 微赤到石膏 細研

右為末煉蜜九如梧桐子大每服二十九至三十九 大麥飲下日三夜一 茱萸 黄連五兩栝樓根) 出聖 两麥門冬心焙 車前子兩黃連去須牡蠣 土瓜根切姜鞋各三 治럙中渴不止小便數熱四肢無力 治消中小便數 服 白龍骨碎苦參

欠已り事という 黄芩湯出聖海 右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓温服不 便 右為未入研了樂令勻煉蜜和搖三二百杵九梧桐 丁大不計時候以蠶蛹湯下三十九 黄芩心 麥門冬焙心括樓根 碎淡竹葉香一 粉桑螵蛸海炒雞肚胵心兩金箔五十片 治消中脾胃熱極消穀引食化為小 普濟方 栀子仁 + 石膏

順氣散出海 地骨皮散出り まだひ ルスコー 拘時 時候温服之 赤以此下之不可多利微利至不欲食而愈 右為散每服四錢以水一中蓋煎至六分去滓不計 地骨皮二枯棲根一石膏 而黄連一甘草一兩炎 厚朴!兩大黄與枳實二 出濟生 治消中者熱在胃而能飲食小便黄 治消中虚赢煩熱口苦眠卧不安 卷 б ł 次包四軍全馬 一 黄蘇九出聖濟 豊粉散氏方 補 鹹食及致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅 右搜匀每服二錢長流水調下齒浮是效投猪肚九 右剉水煎五錢食遠服 小便無度 生薑拉粉輕粉 治疗中多因外傷脾熱內積憂思喜啖 治消中 普濟方

猪肚黄連九出五 肚候爛取出入黃連末在内密縫肚口蒸令極爛乗 右以大麻子仁二合爛研水四升調如杏酪汁煮猪 即時消化小便多而色白所食多而不覺飽者 右為末用酥拌和揾三百杵九梧桐子大毎服三十 九温漿水下 猪肚一枚洗去脂黄連五兩搖 黄蘗 粗皮 黄連年 治久病渴變為病中者飲食到胃

次とり事と与 免絲子九山村 力散します 服此 每服三十九温水下不拘時 右為未每服二錢以牛乳汁調下不計時候 熟細切和黄連末以本句擔可充如梧桐子上 免無法沙乾 乾者土瓜根一三兩土瓜根一 治病中渴不止心神煩熱皮膚乾燥宜 治精血枯竭肌膚消瘦發渴 一两 1

又方出十 治病中日夜尿七八升者金方 右為末以酒服五分七日三漸加至方寸七 末調服亦得一方煎兔絲子湯下又方蜜合麵糊九 右為末蜜九梧桐子大每服五七十九米飲吞下為 右汁服一升佳 鹿角泉令 漚麻

たこりらんかう 治消中日夜尿七八升出十 黄連猪肚九出っ 前庭退可服此補養方見本門 葵菜 斗煮取三斗宿不食平且二服三升即冬葵俗呼 茯蓉 五味子 用葵根如五升盆大雨束外臺云五十斤以水五 あ方 治消渴 治强中消渴服石子葬港湯方在 普濟方 山茱萸各等 稍渴頻

黄連猪肚九出た 枯樓散出聖漸 金月四月月 飲下 日二夜一 右為細末煉蜜丸如梧桐子大毎服三十九用鹽酒 右為 散與鉛丹和匀每服二錢用醋半合沸湯調~ 港湯 本類後便可服此亦能補養 枯樓根 黄連 治內痛肌膚羸瘦或轉筋小便利甚 治强中渴服枯樓根散为見, 防巴到鉛丹两各 两半

欠己日華という 茶草九出十便 可丸如梧桐子大每服七十九米飲送下隨意服之 右為末納猪肚中縫塞安甑中蒸之極爛木臼小 夜數十行氣乏內府謂之府中宜服此藥 如不能九入少煉蚉 蓰蓉 五味子 猪肚如食法黄連 舸 各四麥門冬去心 **岩其人素渴引飲一旦不渴小便日** 普済る 山茱萸 乾山藥 小麥五兩天花粉

止渴潤燥湯出魚 金ピクロカイラー 陰頭退縮古白乾燥唇口乾眼溢黑處見浮雲 大每服三十九空心米飲下 右叹咀都作一服水二碗煎至一盏去浑食後温服 右件藥等分搖羅為細末以酒煮麵糊為充如桐子 防風根或荆芥穗錢熟地黄分小椒分細辛 分杏仁简桃仁泥钱麻仁泥 當歸錢 紅花許 + 發柴胡七甘草分黃相酒浸知母錢石膏 治病中大便秘溢燥硬兼喜温飲 卷一百

次是四軍全馬 一 清凉飲子一名生非甘露 右㕮咀如麻豆大都作一服水二盏酒一 乾自大便結燥小便頻數 尼辛執物 黄 酒製黄蓍或黄芩一錢 膽錢五分黃蘇五分紅花許桃仁角杏仁首生地 錢吳甘草錢石膏-發知母一錢漢防已五草龍 羌活錢柴胡錢升麻銀防風五當歸分、生甘草 湯出誠効 方 普濟方 治疗中能食而瘦口乾舌 匙煎至 **十** 六

甘草石膏湯一名清神 盖去洋稍熱食後服 右件對如麻豆大都作一服水二蓋煎至一蓋去浑 滑微腫咽喉嚥睡覺痛嗌腫時有渴白沫如膠飲冷 則稍緩及有口乾腹下不能如肉起 升麻-石膏分杏仁質熟地黄分小椒質細辛分黄連三 紅花沙防已錢荆芥穗送生地黄 + 柴胡分桃仁錢當歸錢知母美甘草五 補氣 方 治病病全愈再添古白 分

轉熾縦然食物不作肌膚腿脛消細骨節痠疼小便滑 治强中並長與不交精自出傳過獨方湯而面亦黑贏 次足四華人生 夫稍肾者是腎臟虚憊膀胱冷損脾胃氣衰容邪熱 右㕮咀用禾根及鹽湯少許同煮服 脚酸疼師云不如土真 稍熟食後服 茯神 去本皮半 枯樓 根送遠志 半两去 消野附論 普濟方 ナモ , is

乾地黄九出聖 名鸦野也 虚耗唇口乾燥精液自泄或小便白濁大便乾實或渇 而且利或渴而不利所食之物皆作小便腎氣稍損故 服石散而取極情遂致過度真氣既盡石氣孤立唯有 房中至年長腎氣虚弱百病既生又年少懼不能房多 弱陰萎唇乾眼滋身體乏力 忠方 治痛腎煩渴小便數多味如態糖脚

數故曰肩腎也凡人處生放恣者壯時不自慎情極意

セナ

次定四車を与り 桐子大每服於食前以温酒調下三十九粥飲亦得 右為末入石英硏今自煉蜜和搖五七百杵九如梧 前子两桑螵蛸微炒白石英小飛過 山茱萸 草無動白茯苓分 桂心年人参薩頭 附子去皮臍 牡丹皮三甘 志去心兔絲眼乾别研末 牛膝去的无寒线車 乾熟地黄四五味子錢黄蓍生的枸杞分內從 刮去歇皮灵乾麥門冬去心焙薯指分澤鴻銭遠三分酒浸一宿麥門冬一雨半薯指三澤鴻五 普濟方

肉從蓉九 力 肉從茶刊去 當歸 焙~澤寫#五味子 微 赤两划炎 **黄**雨去 两磁石 恵出 方聖 禹餘糧 雞 協一 麻 研 醋 粗酒 治病肾小便滑數四肢羸瘦脚 皮浸 三三 脛 研醋 子 遍雨機一如淬雨半 £ — 百 乾宿 熟乾地黄五钱麥門冬 t t 丹皮平桑螵蛸 甘 啊

次を四車を馬 **腎瀝散出聖** 右為散每服用羊腎|箇切去脂膜先以水一大盞 右為細末入研了藥今勻煉塞和搗三五百杵九如 梧桐子大每服於食前以清粥飲下三十九 去赤钊 白茯苓两芎䓖二元冬雨提碎水淘白茯苓 骨雨甘草 泉赤到麥門冬去心五味子兩磁石 螵蛸一两澤鴻一克熟地黄一桂心! 雞肌阻假炙遠志去心人參 廣頭 黄蓍山雨 治病肾腎氣虚損發渴小便數腰膝痛 善海方 两當歸兩龍

金グビルという 鹿茸丸きす 滑數不禁不思飲食心神煩亂 半分煎至五分去滓空心温服晚食前再服 半煮腎至一盏去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑 鹿茸品及後黃 人參薦頭 澤鴻分亦石脂分 螵蛸微炒子茶四龍骨分桂心再牡蠣一兩塊 石斛根切 熟乾地黄西麥門冬心焙 白茯苓 分单解到白芍藥分甘草做赤判黄蓍生分桑 治病肾氣虚羸瘦四肢無力小便色白 巷一百七十八

敗定四庫全書 増損腎腫湯生す 取三升分為三服 右水二斗五升先煮羊腎取一斗二升次下諸藥散 心及晚食前以清粥飲下三十九 右為末煉塞和搖五七百杵九如梧桐子大每日空 芩 五味子五生薑兩大棗七十麥門冬十 羊野具遠志 龍骨 乾地黄 人參 治腎氣不足消渴小便多腰痛 普濟方 黄芩 澤鴻 甘草 桂心 當歸 芎 茯

金銀箔九出聖濟 人參散明論 右為末入確砂仁三錢每服五錢水一蓋煎至七分 小便多 人蜜少許再煎三二沸去浑食前食後服消痞丸 白术 草二兩石膏一滑石 葛根 黄芩 澤鴻 绿 大黄 治病肾口乾眼溢陰萎手足煩痛 枯樓 ð 寒水石雨 枯梗 薄荷 七十八 白茯苓巴上各甘 栀子 連翹各半

次定四車全書 一 鹿茸九一名黄者九 度心神虚煩四肢羸瘦不思飲食唇口乾燥膝脚乡 右除别研外搖羅為末再研匀煉蜜和九如梧桐子 大每服二三十九煎棗米飲下不拘時候 冬月两半 巴戟天去乾薑兩半 桔樓根四丹砂二兩麥門 金箔 白茯苓皮料生乾地黄焙葛根各三五味子 銀箔各一百澤寫一 普濟方 治失志傷腎腎虚消渇小便無 內從蓉焙 見各二

古瓦湯 1957トライニュ 右為末每服二大錢用多年古瓦椎碎煎湯調下不 力 右為末蜜九如梧桐子大每服三十九米湯下 乾葛 浸山茱萸 鹿茸三分去麥門冬二雨熟地黄 冬 地骨皮的半人参分 天花粉 治痛腎腎痛中飲水無度小便頻數 破故紙炒五味子分二茯苓 元冬 雞肚胫将就人參分 T Ł

欠Eの長人時 阿膠湯 枯樓根九 服 右㕮咀每服三錢水一蓋煎至七分去滓不拘 拘時候服 括樓根一赤石脂科 黃連 甘草成三大麻子两二 阿膠泉乾薑一兩遠志四两附子 治病肾小便數 治消腎小便數 普濟方 去皮人參

著摘九 金にプロア 思飲食 桐子大每服不計時候以清粥飲下三十九 右為末入硏了藥令匀煉審和搖五七百杵九如梧 著預 龍骨用白茯苓用山茱萸用麥門冬 炒做子茶一牡蠣 炙微 **划熟乾地黄** A Triple 雨雞肌脛做炙丹皮 治痟肾小便滑數四肢少力羸瘦困乏不 兩石膏細研黃者 為粉 兔絲子眼乾别一兩燒兔絲子一兩浸 人科黄者 劃 八酒三 杵 Ð 七三

欠日日本と言 枸杞子凡 右為末煉蜜和搖三五百杵凡如梧桐子大每服五 食前以清粥飲下三十九 右為末煉蜜和搖三五百杵九如梧桐子大每服於 牛膝 皮各 桑螵蛸 枸杞子 地黄一桂心平浑瀉半附子半两炸枸杞子 乾地黄洗麥門冬去心各山茱萸 牡丹 兔絲子研婚白茯苓 黄者灵牡蠣粉 治病肾大渴困乏小便滑數 括樓根各三難內金微炒 曹清ら

宣補九十名次 金グピカノコー 十九食前粥飲下 同和為劑九如梧桐子大每服三十九煎葛根湯下 右除兔絲子外搖為末和勻用牛膽汁三合并煉蛋 不拘時一方有從神無白茯苓 黄耆 料括樓根 六兩肉從容焙乾四兩兔絲子 据為末二兩到各內從容詢浸薄切兔絲子 酒浸一宿别 茯苓皮則黄連 知母与两 石膏碎乾熟地黄 治消肾多渴小便數 麥門冬培心甘草是人參 卷 — 百 モナ

平補九 大足四重 在時 枸杞子丸 虚煩 食前以粥飲下三十九 右為末煉審和搖二三百杵九如梧桐子大毎服於 **樓根公澤鴻** 枸杞子 白茯苓 黄耆一两雞肌胫做炒 枯 心焙壮赐為於 桑螵蛸哉車前子分三半去壮赐一兩烧桑螵蛸微車前子分三 治狷腎不渴肌肉瘦削小便溢數而瀝如 治鸦肾久渴不瘥困乏小便滑數心神 牡丹皮 普游方 山茱萸各半麥門冬 Ŧ

熟乾地黃散 多じろせ 鹹湯食前服 燥腿膝消細漸至無力 欲滲之状 右為末糯米糊丸如梧桐子大毎服五十九聚湯或 楝肉 從答三錢半 乳香錢 兔絲子 酒浸山茱萸 酒浸當歸 牛膝 治瘠腎小便滑數口乾心煩皮膚乾 胡蘆巴炒厚杜仲蓋製炒巴乾 荩 õ 益智仁各半

欠足り事という 白茯苓丸 時候温服 腈今肾枯燥遂致此疾即兩脚漸細腰脚無力 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去滓不計 白茯苓 覆盆子 熟乾地黄 冬七桑螵蛸炒枸杞子分 龍骨一 來去 其膝去苗各 Ų 治消腎因消中之後胃熱入腎消燥腎 雞此胜後黃者当白茯苓再 普濟方 黄連 日 枯樓根 + 牡蠣粉為 Ī

黄耆九 金グロルスニア 前磁石湯下三十九 右為末煉蜜和搖三五百杵九如梧桐子大每於食 瘦服此方 床子 黄者到 龍骨三分內從容三分酒浸一宿到 澤寫分五味子兩丹皮兩生乾地黃而兔絲子 熟乾地黄 石斛是分去 治病肾肾虚小便滑數腿膝消細無力漸 草群 元参西 参一百七十八 雞肚狂微笑 蛇

牡蠣九 次已日都 在時日 右為末煉蜜和搖三五百杵九如梧桐子大每服食 前以温酒下三十九一方無五味子 右為末煉審和搖三二百杵九如梧桐子大每於食 桂心各半白茯苓一兩鹿茸二兩去毛達黃者一 牡蠣粉龍骨 土瓜根 判熟乾地黄二 乾别指為末 桑螵蛸微炒才竞微黄去瓤酒浸三日 曝 桑螵蛸 半雨只炙半雨麸炒 治痟腎小便滑數虚極羸瘦 普濟方 人参去養頭甘草微泉 Ī

地黄湯 黄耆九 者宜服此 前磁石湯下三十九 右末煉審和九如梧桐子大毎服三十九煎棗湯下 别拉末一雨酒浸一宿烙 畃 人参公鹿茸 一宿焙乾 治府肾脚脛瘦細小便數或赤臟腑虚冷 治痟肾腎虚小便滑數 Ξ 粗 分 皮 半 剉 毛一两黄者当 枯樓根而桑螵蛸 炙 雞肚歷四枚山茱萸三兔絲子 б Ł + 火とり事人前の一個 山茱萸丸 不禁 右件㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日 三夜一服 蒺藜子牛两 桂心去相皮衛斯丰 熟乾地黄生麥門冬去心始甘草 两牛膝是培 韭子各一兩內從答將各一兩一牛膝去苗酒韭子慢火炒內從答酒浸一宿 山茱萸雨黄者丽料一 治病肾自腰巳下瘦弱無力小便數或 普濟方 杜仲去粗皮炙桂心去粗 半切

黄耆飲 阿膠湯 多らく セラム ノニー 温服日三夜二 耆涉下日三服 右為細末煉審為九如梧桐子大每服二十九煎黄 右㕮咀每服四錢水 黄耆 雨 龍骨碎二 自對杜仲 治病野乾渴小便多羸瘦少力 治虚熱小便利而多服石散人虚な 是 山茱萸 一盏半聚一枚煎至一盏去浑 Ł 知母加

大とり事といい 羊乳九 右用三件和黄連末為九空心飲服三十九如梧桐 弱虛滿而渇 說云小便利多白日夜數十行至一石五日頻服良 右㕮咀水七升煮取二升半去滓納膠令烊分三服 取冷患脚氣喜發動兼瘠渴腎脈細弱 黃連不服生枯樓根汁 羊乳汁 阿膠上麻子, 乾姜一遠志四 治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚 普濟方 主人

胡桃九 中年少懼不能房多服丹石及失志腸胃遂致唇口 癰疽水出不止死 便大利而不甚渇 乾燥精溢自出或小便赤黄五色浮濁大便燥實小 **瘠渴經百日以上不可灸針則瘡中膿水不止或成** 丁大漸加至四十九日三重病五日瘥無羊乳牛乳 人乳亦得苦藥若難服者小麥粥飲服主虛熟凢人 治痛腎亦云內痛多因快情縱愁極意房 百七 九三日東 Liter 國 滓温服 右㕮咀每服二錢水一盞楮葉一片切煎至七分去 米飲調下食前服 右等分為末審九梧桐子大米飲下三十九或為 煮焙乾同 附子处縣 青黛各半 治稍肾飲水無度腿膝瘦細小便白濁 胡桃肉 湯去薄附子 普所方 皮研 切作片生姜汁 大者 枚去皮

救活九 尚香湯 金グロイバー 右為細末每服三錢温酒一盞調服食前 右者稀粥入審飲之一方無審 瞿栗子 当香炒苦棟炒谷 天花粉 大黑豆 治腎病病在下焦初證小便如膏油之狀 治肾虚病渴難治者 治肾渴解五石毒 セナハ

小兔絲子丸 たいりまれたかり 茯苓湯 右前藥以天花粉北五味子煎湯下方見色 右等分為末麵糊丸如梧桐子大黑豆百粒煎湯 消肌肉化為小便 右㕮咀每服六錢水二蓋棗三枚擘破薤白五莖切 桑白皮到三桂心去粗皮磁石指如麻粒大淘 赤茯苓皮黑澤鴻 治三焦氣不通宣膈壅停水不下至腎腎 治消腎 普済方 麥門冬培 杜仲去粗皮灵 势疸門

黄者九草九鹿 金げでアノイ 瘦不思飲食唇乾口燥脚膝乏力前在 多渴面赤羸瘦勞傷腎經 血脈未行肌膚未潤更服一劑 服至晚亦然此藥內消不吐利服一劑記津液未通 細煎至一 出鄭氏家 伸涓洞 蓋去滓分二服空腹温服如人行十里再 炒精米白茯苓粉煮各半两 方 治疗腎小便無度心神虛煩四肢羸 治腎水不足心火自用口舌焦乾 Ł 沈香三钱不

大小日本 山南 治病腎小便數当本 治消腎小便數 黄同為末乾蒸餅入水為丸裝豆大每服十九至二 右二味先將乹姜切碎入鹽四大錢同炒令乹姜色 右搖篩酒服方寸七漸漸加至一七半 右㕮咀用糯木根煎服 鹿角 朝頭惟肯 一兩半細研如粉乾姜半两味 具炙 普濟方

躁也内經謂諸躁狂越皆屬於火盖以心腎氣衰水火 金万口万人 熱積熱不散伏留於上焦之間故令渴而煩躁也 水心主於火腎水枯竭則不能制於火火炎上行而干 **甭渴煩躁者陽氣不藏津液內燥故令煩渴而引飲** 於心心氣壅滯則生於熟也此皆由下焦久虛因虛生 夫稍渴煩躁者由腎氣虚弱心臟極熱所致也腎主於 十九空心鹽湯下 痟渇煩躁 附 論 巷 H

次定四軍全書 **柴胡飲出聖濟** 麥門冬湯! 不相濟故也 右㕮咀每服四錢水一盞入生姜半分切淡竹葉: 骨皮 片煎至六分去滓不拘時温服 麥門冬培心黄者当黃連母桑根白皮到各石膏 知母好枯樓根分三人多 出聖濟總録 赤茯苓去黑升麻各半 治病渴上焦虚熱心中煩躁 善游方 治瘠渴餐熟心神煩躁 甘草與乾島到地 圭

兼氣散忠方 右為散食後煮大麥飲服方寸七日二夜一服漸 去浑食後温服 右㕮咀每服四錢水一蓋入生地黄半分煎至七分 木通半两 成粒 括樓 石膏研甘草具各村子皮二 柴胡去葛根 蘆根 地骨皮 桑根白皮分到月母去 治病渴心煩躁 1 心犀角勢甘草以 百合教知母地 ŧ

次定四車全書 麥門冬湯忠方 生地黄飲子一名地黄飲 姜半分煎至五分去滓温服 右用水七升煮取三升半再服一方用黄芩半两生 至二七不利忌執麵海藻松菜 麥冬雨土瓜根一小麥的竹葉也 批把葉出毛枳殼去熟石斛去根澤鴻 ,盖生乾地黄洗熟地黄洗黄者每天門冬去 治病渴小便多煩躁不得眼 普濟方 治消渴咽乾面赤煩躁 麥門久

麥門冬散 清利肺經潤澤則大腑流畅宿熱既消渴自止造 精深妙無踰此 温服此方乃全用二黄丸甘露飲料生精補血潤燥 止渴佐以澤鴻枳殼疎導二腑使心火下行則小腑 右到散每服三錢水一盏煎至六分去滓食後臨卧 麥門冬而生乾地黄 而人參 心甘草等分去甘草矣各 出聖 治病渴心躁煩熱不得睡卧 五錢去

大にり事という 片煎至六分去滓不拘時温服 右為散每服四錢水一蓋入生薑半分淡竹葉二+七 黄芩 石火两煅 草 青黛研麥門冬培心葛根到一半夏湯洗去滑七)出聖濟 微赤對川升麻西黃連去鬚宗胡去苗茯苓 知母兩半栝樓根分天南星者半兩寒水 治煩渴不止咽乾燥熱昏悶 普濟方

桑白皮湯 日再 右㕮咀每服四錢水一盞半前至一盞去滓食前服 右為末麵糊為允梧桐子大金箔為衣每服十五九 人参竹葉湯下食後服 桑白皮 ച人參 机把禁製去毛黄連去影葛根到淡竹葉洗土眼 治病渴及心臟躁熱飲水無度 知母始麥門冬生心地骨皮 百 Ł 十八

地骨皮散 欠日日華という 竹葉二十七片煎至六分去滓不計時候温服 右為散毎服四錢水一盞生姜半分小麥一百粒淡 地骨皮 皆 自 地骨皮分黄芩三川升麻三半两生地骨皮 13 赤茯苓が生乳地黄の黄芩ご 一两枯楼根一两零門冬! 治病渴烦躁飲水止 两括樓根一蘆根山 人参 治消渴體熱煩躁宜服此 普海方 去心知母分 蘆頭 华丽去

括樓九 知母散 金げんせんとう 七片煎至六分去滓不計時候温服 右為散每服四錢水一蓋入生姜半分淡竹葉二 十七片煎至六分去滓不計時候温服 右為散每服四錢水一中蓋入生姜半分淡竹葉: 葛根到甘草各三分 馬牙硝一雨 知母 治痛渴煩躁小便不利 麥門冬去心各黄芩 治瘠渴心熟煩躁口乾頰赤 川升麻 犀角屑

|飲定四軍全書 | 梅蘇九 候粥飲下 右為末煉黄蠟汁拌和為九如雞頭實大每服 右為末煉蜜和九如梧桐子大毎服三十九不拘時 白梅肉 苓申苦參對 土瓜根申赤茯苓一 三两百樂煎三十草再半去心百樂煎三十草具到 枯樓根二麥門冬心培 知母两人參盖頭 治痟渇腢熱煩躁生洋液 紫蘇葉 烏梅內各半人冬後麥門冬 普濟方 一段到一 訶梨勒 处去根

知母飲 黄耆湯 汁二合食後分為三服温下 右㕮咀每服五錢水三蓋煎取二蓋去滓生麥門冬 含化嚥津不拘時候解渴 黄耆的三白茅根两麥門冬居三兩石膏內白 知母怕生姜根的三土瓜根四黄芩心 甘草 兩龍骨西大黄二两 治痛渴心中煩躁 治病渴心脾實躁熱多渴化為小便 ð 次定四車全書 一 麥門冬散 蘆根散 右為散每服四錢水一中盞入生姜半分淡竹葉二 右吹咀每服五錢水二蓋前至一蓋去滓空腹温服 十七片煎至六分去滓不計時候温服 **举而桑根白皮到 甘草 做赤**到 蘆根到赤後爷 麥門冬去心各人參其兩去 苓三两 車前子西生 甘草之两半 治病渴煩躁體熱不能食 治稍渴煩躁羸瘦乏力不思飲食宜服 普濟方 きも

麥門冬飲 湯調下一錢 右為細末入研了藥令匀每服不計時 此 連 麥門冬 生麥門冬 去類銀箔 三两甘竹瀝合小麥合生地黄馬知母去心甘竹瀝三小麥 例 金箔各五十 惠 热盛煩躁恍惚 T Ł 研 + 為末黄

蘆根湯 **火足四車全島** 許分二服食後下 右㕮咀每用半雨水三盏煎至二盏去滓入竹漲少 便多羸瘦 右㕮咀每服三錢水一盏煎取七分去滓食後乗過 細服 門冬去雨 蘆根一黄者 治痛渴心脾中熱煩躁不止下焦虚冷小 牡蠣

冬瓜飲出里 宜服此 汁每於食後以清粥飲調下一合 之又以黄土脭封裹可厚一寸候乾即以糠火燒之 右件藥指甘草黃連為末都入冬瓜內即以頭却盖 日待冷去沒置於露下一宿取瓜爛研生布絞取 便并地黄汁石蛋白 大冬瓜去頭子 去頭子 黄連去鬚甘草 微赤约童子小一枚剖開黄連一斤甘草二两炙童子小 治痛渴煩熱飲水不止或成骨蒸之狀

人参白木散大成 大日日年全島 右為末煉蛋和劑更於鐵臼內塗酥杵勻九梧桐子 大食後温漿水下三十九 松悸發渇飲食減少不生肌膚 黄連鬚枯樓根 二兩 出聖濟 · 参美白木銭薄荷兩縮砂仁銭生地黄 治病渴心胸煩躁 甘草以栀子仁 治獨爆濕相搏元府緻密煩心 普濟方 微炒各香致炒 二十九 茯苓

黄連九出聖 人參飲 右為未每服三錢水一盞煎至六分去滓温服食前 日二三服 右㕮咀水五盏煎取二盏去滓温頃服之 黄連二两苦參斤麝香 皮甘草西 滑石西藿香主錢石膏 两白茯苓皮 甘草半两麥門冬七分 治消渴胸膈煩悶燥渴飲水無度 治消渴煩熱悶亂宜服 **セ** ナ ハ 火足の事全十二 白磐九出聖海 天門冬煎總銀 過漉出別以熟水一盏下蜜攪勻瓷瓶中貯浸天門 右先將生水五蓋煎天門冬至三蓋新汲水淘四五 冬五日客封毎食後|服 日再任意喫茶不限多少一方用粥飲下 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服六十九空腹茶下 生天門冬去心白家煉五 治消渴煩熱 治病渴煩躁驚悸不安 普濟方

葛根湯出聖 治膈上煩熱多渴通利九竅 損人 右攪勻不限早晚渇即飲之一盞量力飲頻服亦不 右細研令匀煉塞和丸如雞頭實大綿裹含化嚥津 滑石;二 生葛根五斤去皮細切木科的中爛白塞雨 白掛法金鉛白霜谷 治稍渴煩熱心中狂亂皮膚乾燥宜服 ð 出 傻方 刖 赴

次七四事全書 栝樓根九 治痛渴心神煩躁小便不利。 右令净洗煤遇者米飲澆作盤候葵黄色取汁渇即 飲之以瘥為度 温食之効 右搗碎水三大蓋煎取二盏去滓下糯米二合煮粥 括樓根一麥門冬心焙 甘草 葵大栗 治病渴心煩躁悶 普濟方 十一世 美 美)三合

衛香散忠女 右用栗米飯和九如箓豆大每服不計時候以姜湯 **候以清粥飲下三十九** 右為細末煉蜜和搖三二百杵九梧桐子大不計時 香細分 水地皮炎 黄摇末 赤石脂半澤鴻半石膏一 治府渴四肢煩熱口乾心躁宜服此 一百七十八 蝸牛不限多少水浸五日

とこうえ 治發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脈洪大 四君子湯 時候 血虚發躁當以此治之 按之無力者或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此是 右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘 白茯苓去人參頭)出 聖濟 /-----出御 院方 樂 治病渴煩躁心臟熱引食古乾燥類 治煩熱躁 頭 甘草泉白木分等 放粹方出聖濟生

銀匠四厚全書 梅肉圓家藏方 含化 右㕮咀水煎服 右為細末熟甘草膏為九每兩作十五九每服一九 黄者两當歸 薄荷葉 去土 最 豆粉 五 百藥煎一鳥梅肉两朴硝兩縮砂仁平香白芷平 肺消 附論 生津液止躁渴凉咽喉 兩 一百七十八

内經謂心移寒於肺為肺消肺消者飲一溲二死不治 心火內樂金精肺臟銷樂氣無所持故其證飲少而溲 所勝者逆逆則難治心受邪傳之肝肺是為逆盖寒隨 於肺則當補肺金平心火而疾可愈 多也當始病之時宜去其寒邪使不得栗心火而移害 夫病心有傳傳有順逆傳其所生者順順則易治傳其 とこううここう 黄耆 英色教 土瓜根西半拔葜 地骨皮 治肺消飲水少溲多 普斯方 7 五味子

釗定四庫全書 黄者湯出宣 痿劣 温服空心日午各一 右㕮咀如麻豆大每服五錢水二盏煎至一盏去滓 右㕮咀每服五錢水二盏煎至一盏去滓温服日三 黄者三五味子 两人参 石膏 牡蠣服各 8年1枸杞 治肺消飲少溲多補肺平心移寒在肺 熟乾地黄 两一分 人參 麥門冬培心桑根白皮

飲定四車全書 兔絲子散 乾薑甘草湯 右為細末每服三錢空腹煖酒調下日二 乾薑和 生乾地黄 培麥門冬培 蒺藜子炒桂 兔絲子 两肉從蓉度焙一兩五味子 去粗續断各二十草文 爛焙乾一兩浦黄酒浸一宿提 治肺消飲少溲多 治肺消 普濟方 雞肚胫黃皮烙各 二两半硝石)去频各 四十四

之疾 麥門冬飲故棒 **血肺主氣俱受邪熱宜不息而消故久則引飲為消渇** 既熾移於爍金二臟俱熟熏蒸膈間而血消爍也心主 夫心移熱於肺傳為膈消夫心肺二 服空心食前日三 右攻咀如麻豆大每服五錢水二蓋煎 膈消 附 論 一臟皆居膈上心火 盏去滓温

生

治膈消胸中煩渇津液燥少短氣

沙之四軍全馬 竹葉湯 多渇 右㕮咀如麻豆每服五錢水二盞入竹葉數片煎至 蓋去滓温服日二夜一食後 竹葉祖麥門冬站的茯苓去黑枯樓實妙也骨 生乾地黄 焙人麥 葛根 生姜和三甘草取 治膈消煩渇津液燥少 善游方 两 大豪西小麥的六 一作知母 茯神 甘草灵五味 . 去皮各 置

括樓湯 知母湯 後服 後温服 右㕮咀如麻豆每服五錢水二盞煎至一盞去淖食 右攻咀如麻豆每服五錢水二蓋煎至一盞去滓食 小麥汽命大棗去枝甘竹葉一升甘草及二 知母 焙澤鴻 治膈消多渴 治膈消胸中煩渇 白茯苓皮黄芩皮 百 Ł 生姜切各

次足四軍全等 **黄者飲者湯** 後温服 右㕮咀如麻豆每服五錢水二盏煎至一盞去滓食 右㕮咀如麻豆每服五錢水二盞煎至一盞去滓食 黄耆 茯神去枯樓根 生乾地黄四两 两 括接根西麥門冬培 茅根各 治膈消胸中煩渇 普濟方 麥門冬姑心甘草 罕立 灵各 三雨

雞内金九此胜九 人参石膏湯出海生 後温服 温服東垣加黄芩 右為粗未毎服五七錢水二盞煎至一盞去滓食後 右為末煉蜜丸梧桐子大毎服二十九食後温水下 雞內金託縣枯樓根炒各 人參再石膏二銭知母钱甘草與 治膈消 Ł 治膈消上焦燥渴不欲多食 F Ł

火ビの車を時一 生津甘露飲出衛生 以成之疾既効亦傳瘡瘍享年七十五終其藥名之日 地黄煎 生津甘露飲子 順徳安撫張芸夫年四十五府渇古上赤裂飲水無度 枯樓散黑散 小便數多先師以此藥治之良愈古云痟渇多傳瘡瘍 稍加至三十九日三 黄丸 名地 治膈消引力 治膈消除熟方見本門 普滴方 治膈消大渴飲水無度舌上 方見本門 學之

金げんであんず 身色黄目白睛黄甚則四肢痿弱無力面塵脱色脇 溢上下齒皆麻古根强硬腫痛食不下腹時脹痛運 下急痛善怒健总臂腰背寒雨尻冷甚 石膏 錢升麻沒薑黃錢知母酒製當歸幾全喝錢藿香 翹錢杏仁錢半一麥門冬錢黃連錢木香錢桔梗 溢茄线白豆笼钱白葵 黄蘗 酒拌二白芷食連 ,柴胡分崩香钱 銭人參錢生甘矣 甘草 送山栀子 惠

白葵蘭香甘草之辛寒和血潤燥為佐以升麻柴胡 **告鴻之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之** 以取之又為因用桔梗為舟楫使浮而不下也右件 補水為臣以當歸人參杏仁麥門冬全蝎連翹白芷 水之源以制陽光故以黄連栀子知母之苦寒瀉熱 朝不能故以石膏甘草之甘寒為君於元子云滋 **瘠渴之病燥熱之氣勝也內經日熱 滛所勝佐以甘** 平行陽明少陽二經白荳蔻木香華澄茄藿香反佐

設定四車全書 一人

清済方

節如米大食後每服二錢抄於掌內以古紙之隨津 **囈下或送以白湯少許亦可此治之緩也不惟不成** 老人有云能食而渴者白虎倍加人参湯主之大作 中滿亦不傳瘡傷下消矣東垣先生常謂予日潔古 作湯劑廣服之 湯劑多服不能食而渴者錢氏白木散倍加葛根大 為細末湯浸証餅和勺成劑捻作餅子晒半乾杵碎 稍渴口舌乾燥附論 — 百 次定四車全馬 燥治法當滌去心脾積熟使臟直濡於肺則愈 夫脾主口心主古瘠渴口古乾燥者邪熱積於心脾津 麥門冬九出聖濟 疫枯耗不能上凑故也其證飲食無味善渴而口古乾 悶健总怔忪 膝割 扌 牡蠣 以 龍膽草 麥門冬培心土瓜根到山茱萸 對 狗脊 在毛茯神去人參 各 總錄 治府沿口乾喜飲水小便數心煩 .普濟方 兔絲子 酒浸一 鹿茸 黄連 循爆乾 兩 四十九 酒浸 去鬚二 两五錢 别

犀角九出聖 まりて ノノニ 煮小麥飲下加至三十九 右為未煉家九如梧桐子大海服二十九不拘時候 右為末入研了藥今匀煉蜜和搖五百杵九如梧桐 子大每於食後煎竹葉湯下二十九 犀角屑少鉛霜細研麥門冬 心好 鐵粉一两甘 兩胡黃連分 微赤 對赞金 书括接根三子葵 半获神 半元葵 治府渴口古乾燥煩熱心神如狂 百百

升麻丸出聖海 麥門冬散思力 とこうをここう 候温浆水下之 右為末煉蜜和九如梧桐子大毎服二十九不拘時 赤煩悶 升麻 麥門冬去心地骨皮三括樓根分人來產頭 蘆 知母的分前胡頭 鼈甲醋夹去部扑前研 黄連 治疗渴口舌乾燥心神煩熱 治痛渴口古乾燥四肢痰疼日晡頰 龍膽 普游方 黄達去黑犀角勢養鞋 Ŧ

金月四月月十 人參散忠力 右為散每服五錢水一大盞入生姜半分竹茹半分 小麥半合煎至五分去滓不拘時候温服 石膏 草 人參產頭 根到一番者当一甘草概赤切黄芩分茅根一根一两黄者三分甘草半两炙黄芩二茅根一 微赤到蘆根二兩葛根二分黃者三分川升麻 董頭 地骨皮两赤茯苓分麥門冬去心甘 治病渴口古乾燥煩熱

磁石湯!! とこうをここ 燥 右㕮咀分為五貼每貼先用水三盞與磁石一 片煎六分去滓不計時候温服 右為散每服四錢水一盞入生薑半分淡竹葉! 磁石 者到地骨没到生乾地黄焙五味子 枳殼去熟檳榔到各 出聖濟 乾分為五 两半狼如麻子大先以水 治病渴腎臟虚損腰腳無力口舌乾 胋 普濟方 用綿裹每 淘去赤汁候 貼藥內煎之 桂心皮 4 貼同 粗

王泉九出直 銀戶四月全書 烏梅湯 煎至一盏半去浑分二服一方磁石引鐵者火燒醋 淬二十遍用一兩樂七味同為細末温水調下 右末煉塞丸弹子大每一九温湯嚼 甘草的 桔樓根 麥門冬培心人參 茯苓 黄耆半生半鳥梅肉 烏梅內炒二茜根两一黄芩去黑皮 葛根到人参 指方 治疗渴膈熱咽乾止煩渴生津液 治病渴口乾 巷 乾葛和半 一 百 セナハ

人參散出聖 災定四庫全書 一一 止渴到散指方 温服 右為散每服三錢水一盞煎至八分去滓不拘時候 右剉每服四錢新水煎服 简 首大草果上尚淡竹葉 机把葉新布找白乾葛根 白茯苓去黑甘草炙各 治痛渴止虚煩除口舌乾燥宜服此 治渴口乾 .普濟方 半两 甘草生各 生薑切片烙大鳥

麥門冬九出聖 片煎至六分去滓不計時候温服 右為末入鐵粉研令勻煉蜜和搖三二百杵九如梧 右為散每服四錢水一中 蓋生薑半分淡竹葉二七 麥門冬三兩去 枯樓根分知母分黃芩 赤到黄連去須鐵粉細研吳機黃連一兩鐵粉一兩半 麥門冬 赤五錢 茜根半雨批把葉三分找去 恵方 去心人參 薦頭 黄者到 赤茯苓分甘一兩人參半兩去黄者三分亦茯苓三甘 治渴口舌乾燥狂亂 甘草丰

沙皇四車全書 茅根湯 無野海 赤茯苓煎出聖 桐子大每食後以清粥飲二十九下 飲下|茶匙 右調攪令句以慢火煎成膏每服不計時候以清粥 茅根對蘆根對拔與細到各石膏两半 赤茯苓為未白蜜并淡竹憑一小生地黄汁 治痛渴口乾小便數 治痛渴心神煩亂唇口焦乾咽喉不 养濟方 核

麥門冬湯總銀 拘時候 拘時 右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓温服 右㕮咀每服四錢水一盞半煎取一盞去滓温服不 麥三馬梅士枝 生麥門冬西焙 炒淡竹葉 剉 兩 治病渴口乾引飲 衷 枯樓根二茅根 Б Ł 竹如各五小

欠に日本という 茯苓湯 出聖濟 天竺黄散出聖 右㕮咀每服四錢水一蓋半入冬瓜一片同煎去滓 右為細末每服二錢煎竹葉水調下食後 白茯苓皮零門冬各四两石膏西茅根對 天竺 研甘草一分泉 一两黄連去鬚栀子研 川大黄微妙馬一两黄連半兩栀子半两川大黄半雨馬 治瘠渴口乾唇焦心脾臓熱难欲飲 治痛渴心神煩躁口乾舌澁 普濟方 五

金はじたろう 黄連散 鉛霜九出鄭氏京 温服煎至七分不拘時 右為細散每服四錢水一中蓋入生薑半分淡竹葉 一七片煎至六分去滓不計時候温服 黄 黄連二兩葛根二兩多門冬一兩机把葉二兩找 鉛霜平青黛 微 出聖 傳渴濁方 恵方 治消渴口舌乾燥煩熱不能飲食宜服 治府渴口乾煩燥飲水無度 枯樓根各 Б 龍腦子

枸杞湯出 とこうらいら 生麥門冬湯 右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘 右三味以水一到煮取五升去滓渴即飲之 嚼煎竹葉湯下新汲水下亦得食後日三 右細末今匀煉蜜和九如梧桐子大每服二十九微 杨把出 石事 杨把根白皮坐生麥門冬站心小麥 出聖濟 治病渴唇乾舌燥 治病渴口乾體瘦 一兩小麥五錢

冬瓜飲出聖濟 地黄煎鬼鄉 多好四月全書 右一 拘時 時 慢火熬稀稠得所瓷合貯每服一匙用温湯化下 生地黄細切生薑細切生麥門冬二斤 一處於石臼搖爛生布絞取自然汁用銀石器盛 總録 治病渴口古乾燥 治痛渴口乾日夜飲水無度渾身壯 一百七十八

次之四事全等 一 枯樓根丸出聖游 乾燥渇喜飲 碎同煎至一盏去滓温日三夜二服 右二味㕮咀作十二服每服水三蓋入冬瓜一片擘 右為末用生地黄汁半盏於石臼内木杵搗今旬再 入麵糊九如梧桐子大每服三十九食後臨卧牛乳 枯樓根五黃連一兩浮洋草二 冬瓜熟分作十二片。麥門冬去心黃連出兩五 治病渴飲水不止小便中如刺古 善濟方 7 兩五

地骨皮散出干 王夜青出本 食後再服 湯下日三煎菖蒲湯下亦得 右細剉和匀每服半两水一盏煎至五分去滓温服 右為末搖白梅為九如雞頭子大毎服含化三九 地骨皮 两小麥再生麥門冬去四一小麥半生 治病渴口乾燥骨節煩熱 甘草二兩白梅肉四 Ł 次已日奉全時 猪膽丸出聖海 甘草湯 子大每服二九含化津嚥 煎至五七沸每於食後温服一合 右酒者膽候皮爛即入粉研細同煎成膏九如雞頭 右先以水一大盏煮甘草至七分去滓後下髓蛋更 雄猪膽五定粉 羊髓二甘草 煎聖恵 方 名半髓 治口中乾燥無津液而渴 做赤切白塞二一兩吳白塞二 治瘠渴口乾古燥煩熱宜服此藥 普满方

治病渴舌焦口乾飲水無度小便數出 和血益氣湯 治痛渴口舌乾燥骨即煩熱 自じロブ 即飲之內亦可食一方云細切和鹽豉作羨食 右用五味煮令極熟取汁二升半已来去肉取汁渴 右搖絞取汁時飲一二合 野雞 芭蕉根生 隻 名地黄飲 蹇 Б 治口乾舌乾小便數去 Ł + 方肘

次との事を持一 服昔張安撫服此大効 右㕮咀作一服水二大盏煎至一盏去滓稍熟食後 麵房事鹽血 赤脈此樂生津液除乾燥生肌肉服此樂思酒酯濕 黄分防巴五分羌活分桃仁的 歸 連 杏仁前生甘草三分巴上二味石庸六分治小 稍四分甘草分 升麻钱紅花少知母酒沒麻 古上赤脈也生地黄七分黄相一錢柴胡分當酒浸八分治生地黄酒浸黄相酒浸料 普濟方


木瓜九 良方 酸聚九出干 無忌之 右為末審九含化不限晝夜口中津液為度復取含 心六线两 酸栗三升酸安石榴子 南五覆盆子 三烏梅十島 好木瓜而烏梅肉科茴香炒丁皮 根三栝樓根 治口乾燥内痟 生津液止渴思飲食 茯苓雨半麥門冬四石塞四雨桂 白芷终半二

欠己日華という 橄榄九 地黄煎丸 化 右為細末煉審為九如彈子大每服一九含化 右件研匀甘草少許和九如箓豆大每服二三九含 草线二 研 百樂煎一白梅錢檀香錢蒲黃錢腦子冊分麝香 出聖濟 生津液壓壅 治痛渴口乾燥 普海方

枯樓湯一名枸杞湯 麥門冬九總録 金に人ロアノコー 脂消熱傾出將黃連末同搖令得所聚手九如梧桐 右五味先取地黄汁等四味入銀石器內慢火煎令 于大每服二十九粟米飲下日三五服 門渴 介 生地黄 黄連一斤去鬚 开干二 治病渴口乾燥方見本門病 生括樓根取汁二羊脂碎切 治病渴口乾舌焦精神恍惚力 涓

次だ四軍を馬 加減野氣丸出海 學苓飲丁出梅生 多渴引飲肢體消瘦 任下弱甚者加附子一兩萬進黄耆湯 右為末煉客九如梧桐子大毎服七十九鹽湯米飲 黄耆 澤鴻 山茱萸取白茯苓去牡丹皮去熟地黄酒五味子 熟地黄 鹿角勢山樂炒各沈香不見官桂不見火 生方 治口乾燥生津液思飲食 治腎水不足心火上炎口舌乾燥 普浦方 白芍藥 五味子 麥門冬 六十

梅 粥飲喫甚効 右為細末毎服三錢水一盏半生薑三片棗二枚鳥 右爛搖絞汁二升任性渇即飲之一方入粳米攪作 離勘 心 白茯苓分甘草 两人参两天門冬去心兩去白茯苓一甘草 半人多半天門冬 箇同煎至一盏去滓温服食後 恵方 出聖 治痛渴發動飲水無限口乾渴



除煩止悶口乾渇疾止怒令人喜本草 治病渴飲水日夜不止口乾小便數本草 右以生研服之 為妙 **猬渴口乾**本草 右以水一斗浸經宿渴飲之毎日一度易水換生螺 蓮稿 田中螺五

7.	150.00				
飲定四庫全書				右炊作飯	小麥
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				右炊作飯及煮粥食之	
- Kent					

TOWNS IN	Andrews		. N 200	Corporation of the	**************************************	7 . E 2 2 4	
一连							7 - 1-1
湯							1
型型							1
7).
卷	.						1
一五							
普濟方卷一百七十八							
1 +							
	.						!
							E
							ł
							1
H							